

TERMIN ORAZ GODZINA BADANIA:

PRZYGOTOWANIE DO BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Przeciwwskazania do badania:

- **Wszczone urządzenia elektryczne, takie jak: defibrylator lub rozrusznik serca, neurostymulator, implant ślimakowy.**
- W niektórych przypadkach **metalowe ciała obce** w tkankach miękkich (np. klipsy naczyniowe po operacjach laparoskopowych lub odłamki w sąsiedztwie naczyń, narządów mięsnych, gałek ocznych, płytki ortopedyczne, itp.).
- **Klaustrofobia** (patologiczny lęk przed przebywaniem w zamkniętych, niedużych pomieszczeniach). Istnieje możliwość podjęcia próby wjazdu przed umówieniem terminu, informacja w rejestracji.
- Ponadto nie zaleca się wykonywania badania u kobiet w I trymestrze ciąży.

Do badania należy dostarczyć:

- Skierowanie na badanie (z wskazaną okolicą ciała).
- Wypełnioną i podpisaną czytelnie ankietą na badanie (do pobrania w rejestracji).
- **Opisy z płytami wcześniej wykonanych badań RTG, TK, MR i USG oraz karty informacyjne prowadzonego leczenia lub przebytych hospitalizacji dotyczących badanej lokalizacji ciała.**
- Brak poprzednich płyt uniemożliwia porównanie badania z wcześniej wykonanymi (Pacjent otrzymuje tylko opis aktualnego badania).
- W przypadku przebytych zabiegów operacyjnych – prosimy o podanie terminu i rodzaju wykonanych operacji.
- U pacjentów z wstawionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi czy po wszczepieniu klipsów naczyniowych, po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych **należy obowiązkowo dostarczyć do Pracowni MR KOMPLETNĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ DOTYCZĄCĄ ZASTOSOWANEGO LECZENIA WRAZ Z OPISEM TYPU ZASTOSOWANEGO IMPLANTU, A W SZCZEGÓLNOŚCI MATERIAŁU, Z JAKIEGO ZOSTAŁ WYKONANY.**
- W przypadku posiadanych implantów – endoprotezy, stenty, inne metale – **należy dysponować informacjami o rodzaju materiału użytego i dopuszczeniu implantu do badania 1,5 tesli MR oraz dostarczyć zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do badania.** Pacjent posiadający stenty musi być przynajmniej 4 miesiące po wszczepieniu.

Przed badaniem należy bezwzględnie zgłosić:

- Posiadanie rozrusznika serca, metalowych klipsów lub innych metalowych części w organizmie
- Rozpoznane wcześniej alergie lub wystąpienie w przeszłości jakichkolwiek reakcji uczuleniowych na leki lub środki kontrastowe
- Klaustrofobię
- Skłonność do krwawień (skaza krwotoczna) w przypadku stosowania dożylnych środków kontrastowych

W czasie badania jest stały kontakt audiowizualny z personelem i należy zgłaszać:

- **Wszelkie nagłe dolegliwości(np. uczucie klaustrofobii)**
- **Jakiegolwiek objawy po podaniu dożylnego środka cieniującego (duszność, zawroty głowy, nudności).**

Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne, chociaż może wywołać uczucie lekkiego dyskomfortu w związku z koniecznością pozostania przez kilkanaście – kilkadziesiąt minut w jednej pozycji.

Do badania należy przystąpić w luźnym ubraniu, pozbawionym w szczególności metalowych elementów, takich jak: guziki, pasek, zegarek, klucze, karty płatnicze i telefon komórkowy.

W przypadku badań głowy i oczodołów nie należy mieć makijażu i lakieru do włosów. Zaraz po wykonaniu badania można prowadzić samochód, a przed badaniem wolno zażywać leki, ponieważ rezonans nie wpływa na ich działanie.

Badanie najlepiej wykonać w pierwszych 10 dniach cyklu miesięcznego, a także w trakcie miesiączki. **Wymagane jest leżenie w bezruchu, w przypadku pacjentów z silnym bólem należy wziąć leki przeciwbólowe, wskazane jest skorzystanie z toalety przed badaniem.**

PRZYGOTOWANIE (DOTYCZY BADAŃ Z KONTRASTEM)

W PRZYPADKU BADANIA MR Z PODANIEM ŚRODKA KONTRASTOWEGO ZAWIERAJĄCEGO GADOLIN, TRZEBA:

1. Dobrze nawodnić organizm, dzień przed badaniem wskazane jest wypicie większej ilości wody ok. 1,5, 2 L. W dniu badania na 2 godziny przed badaniem ok. 1L wody.
2. **Mieć ze sobą wydrukowany aktualny wynik poziomu kreatyniny/eGRF we krwi (nie straszy niż 7 dni)**
3. **Być na czczo 4 godziny przed badaniem.**
4. W przypadku badania **MR miednicy męskiej(pod kątem oceny prostaty), jamy brzusznej** pacjent wieczorem, przed badaniem powinien wypróżnić się. W innym wypadku w dniu badania konieczne jest wykonanie rano lewatywy (zestaw do lewatywy można kupić w aptece).
Dodatkowo wieczorem przyjmujemy Espumisan 1x 5 kapsułek oraz w dniu badania 3 kapsułki.

UWAGA !

DO BADANIA TRZEBA ZDJĄĆ SENSOR DO MONITOROWANIA POZIOMU GLUKOZY.

Termin odbioru wyniku ok. 3 tygodnie.

Wynikiem badania jest opis oraz płyta CD.

Wynik można odebrać osobiście lub przez osobę pisemnie upoważnioną przez Pacjenta.

UWAGA!

Pacjent nieprzygotowany do badania wg powyższych zaleceń nie będzie miał wykonanego badania!

Prosimy o zgłaszanie się do rejestracji na 30 minut wcześniej przed planowanym badaniem.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z przygotowaniem do badania

(Dotyczy badań z kontrastem oraz bez kontrastu)

.....
Czytelny podpis pacjenta